

仿單標籤粘貼表

產品名稱	“恒安”安碘酒精液	申請廠商	恒安製藥工業股份有限公司
衛生福利部食品藥物管理署給證號碼	衛署藥製字第 055285 號		

“恒安”

安碘 酒精液

(番威隆碘)

外用液劑

Andine Alcoholic Solution “Heng An”

GMP G-11099
衛署藥製字第 055285 號

【成分】每 ml 含有

有效成分及含量：

Povidone Iodine.....100mg (相當於有效碘 10mg)


【其他成分(賦形劑)】：

Alcohol(95%).....0.737mL、Purified water to make 1mL

【用途(適應症)】：緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
 1. 3 歲以下。
 2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦
- 其他使用上注意事項
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量或使用次數。
 4. 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
 5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 8. 本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。
 9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 10. 勿接近火源。
 11. 本藥有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
 12. 會使皮膚或衣物染色。



【用法用量】：

一日數次	塗抹(撒佈或噴灑)於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹
------	----------------------------

【警 語】：

使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 使用 7 天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
3. 使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症狀，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

【包 裝】：4000 毫升以下塑膠瓶裝。

【儲 存】：25℃ 以下儲存

【類 別】：醫師藥師藥劑生指示藥品



經銷商：維星生技有限公司
專 線：0800-220989
製造廠：恒安製藥工業股份有限公司
地 址：台中市西屯區工業區一路 101 號



(1) 報核仿單標籤以粘貼全形實物為原則。

註

(2) 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於粘

貼時附送現品並將照相影本代替粘貼報核。

108. 12. 30

"恒安"

安碘 酒精液

(普威隆碘)

外用液

醫師藥師藥劑生指示藥品

Andine Alcoholic Solution "Heng An"

GMP G-11099

衛署藥製字第055285號

【有效成分及含量】：每 ml 含有：

Povidone Iodine.....100mg (相當於有效碘 10mg)

【其他成分(賦形劑)】：Alcohol(95%).....0.737mL

Purified water to make 1mL

【容 量】：500ml

【用途(適應症)】：緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

【不得使用族群】：曾因本藥引起過敏者。

【用法用量】：

一日數次	塗抹(撒佈或噴灑)於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹
------	----------------------------

【類 別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【諮詢專線】：0800-220989

【使用上注意事項】：請詳閱說明書

【警 語】：請詳閱說明書

【包 裝】：4000 毫升以下塑膠瓶裝。

【儲 存】：25°C 以下儲存



經銷商：維星生技有限公司-台中市北區國強街 3 號

製造廠：恒安製藥工業股份有限公司-台中市西屯區工業一路 101 號

網 址：<http://www.emg0077.com.tw>

批 號：

保存期限



4 712352 991184



LB075-1 V07

